

ワイドに拡がり！

ピタッとくっつく。



芝にも  
適用拡大！

ムラなく拡がり、しかも落ちづらい。  
だから、少量散布でも農薬本来の安定した効果を引き出します。

機能性展着剤


ワイドコート®

# ワイドに広がるから、薬剤の乾きも早い!

ワイドコートは薬剤を速やかに拡げるため、  
表面積が広くなり、その結果、薬液の乾きが早くなります。  
また、その乾きの早さが、ワイドコートの優れた拡張性を示しています。

登録番号：第22709号  
有効成分：ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム…22.5%  
ポリオキシエチレンアルキルエーテル…50.0%  
性状：淡黄色澄明粘稠液体  
容量：500ml


## ■乾くのが早い理由



## ■展着剤散布後の乾燥時間の比較

(日本化学株式会社 社内試験)

(きゅうり葉/ドリフト低減型ノズル200ℓ/10a)



## ■適用範囲と使用方法

適用農薬名	作物名	散布液10ℓ当りの使用量	使用方法
殺虫剤	野菜類、いも類、豆類(種実)、稲、麦類、雑穀類、 てんさい、茶、花き類・観葉植物	1~3.3ml (3,000~10,000倍)	添加
	果樹類	1~2ml (5,000~10,000倍)	
殺菌剤	野菜類、いも類、豆類(種実)、稲、麦類、雑穀類、 てんさい、茶、花き類・観葉植物、芝	1~3.3ml (3,000~10,000倍)	
	果樹類	1~2ml (5,000~10,000倍)	
メタミトロン水和剤、 フェンメディファム乳剤、レナシル・PAC水和剤	てんさい	3.3ml (3,000倍)	
ハロスフロメチル水和剤、 MCPAインプロピルアミン塩液剤	芝	1~3.3ml (3,000~10,000倍)	

## △ 効果・薬害などの注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し使い切ってください。
- 本剤を直接散布液に加え、十分かき混ぜてから散布してください。
- 使用に当っては、使用農薬の使用条件や使用上の注意事項を厳守してください。
- 適用農薬の使用上の注意事項に薬害の生じやすい作物、気象条件などが記載されている場合には本剤の使用を避けてください。
- 作物の幼苗期、高温時など一般に薬害の生じやすい条件では、本剤の使用を避けてください。
- ブロccoli、カリフラワー及び、非結球あぶらな科葉菜類にはコルク斑などの薬害を生じることがあるので、使用しないでください。
- なす科果菜類の果実には散布液の乾きにくい条件(冬季、散布水量が多い場合など)ではコルク斑などの薬害を生じることがあるので、本剤の添加量または散布水量を減らすなどして、注意して使用してください。
- 果樹類では落花4週間後程度までの使用は薬害を生じる恐れがあるので避けてください。
- 果樹類に使用する場合、果粉溶脱の恐れがあるので、使用前に十分確認してください。
- 本剤を初めて使用する場合には、事前に薬害の有無を十分確認してください。

- 塗装汚損の恐れがあるので、自動車などに散布液がかからぬよう注意してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

## △ 安全使用上の注意

- 誤飲に注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。使用中に異常を感じたときは、直ちに医師の手当てを受けてください。
- 散布液調製時には保護メガネを着用し、薬剤が眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。(原液は強い刺激性)
- 皮ふに付着しないように注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。(刺激性)
- 散布の際は農業用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は、他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい人は散布作業をしないでください。施用した作物などに触れないでください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2015年11月現在の登録内容に基づいています。



日産化学工業株式会社

東京都千代田区神田錦町3の7の1  
札幌・仙台・東京・名古屋(北陸)・大阪・福岡  
<http://www.nissan-agro.net/>