



農林水産省登録
第20043号


芝生用薬剤

殺菌剤

芝生用殺菌剤

グラポスト®

フロアブル



発病後の
ラージパッチにも
卓効!

特長



- ① 浸透移行性があり、予防にも治療にも安定した高い効果を発揮します
- ② 使いやすいフロアブル剤です
- ③ 薬害の心配がなく、また耐性がつきにくいいため安心して使用できます

®登録商標



株式会社 二チノ一緑化

芝用殺菌剤

グラポスト®

フロアブル

成分・性状

種類名：フルトラニル水和剤
有効成分：フルトラニル……………30%
性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性

〔毒性区分〕 普通物	急性経口毒性 (LD ₅₀)	急性経皮毒性 (LD ₅₀)
	ラット♂♀ >5000mg/kg マウス♂♀ >5000mg/kg	ラット♂♀ >2000mg/kg
〔魚毒性〕 B類相当	コイ	オオミジンコ
	LC ₅₀ (48hr) 53.3mg/L LC ₅₀ (96hr) 13.5mg/L	LC ₅₀ (3hr) >1000mg/L EC ₅₀ (24hr) >1000mg/L

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用時期	総使用回数*		使用方法	
				本剤のみ	フルトラニル		
芝	日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	発病初期	4回以内	8回以内	1m ² 当り500ml散布	
		フェアリーリング病				500	1m ² 当り5ℓ散布
						1000	1m ² 当り3ℓ散布
	ペント グラス	葉腐病 (ブラウンパッチ)				500~1000	1m ² 当り500ml散布
		フェアリーリング病				500	1m ² 当り5ℓ散布
						1000	1m ² 当り3ℓ散布

*本剤及びその有効成分を含む農業の総使用回数を示す。

効果・薬害等の注意


- 使用前に容器を軽く振ってください。
- 蚤に対して毒性があるので、薬にはかからないように注意して散布してください。
- 散布する場合は、散布液の飛散によって自動車の塗装等に被害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

安全使用上の注意


- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 魚毒性:水産動物に影響を及ぼしますが、通常の使用方法では問題ありません。
- 保管:直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。




葉腐病 (ラージパッチ)



葉腐病 (ブラウンパッチ)



フェアリーリング病



フェアリーリング病

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず、廃棄物処理業者に委託する等により適切に処理してください。

取扱店



株式会社 二チノ一緑化

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 岡谷ビルディング6F
TEL (03) 3808-2281 FAX (03) 3808-2360
大阪営業所 TEL (072) 727-8015
ホームページアドレス <http://www.nichino-ryokka.co.jp>