

新しいタイプの肥料入り芝用殺菌剤

サンブレイク[®] 液剤

サンブレイクは三井化学アグロ(株)の登録商標です。



【2つの成分】

ヒドロキシイソキサゾール

亜りん酸

- 赤焼病・ピシウム病に対し優れた効果を示します。
- 根部の生育・発根促進効果を示し根はりもよくなります。

● 根はりに対する効果確認試験 (ベンクロスベントグラスに月1回(計2回)散布)



無処理



500倍液散布



250倍液散布

※ 白い部分は根です。

(平成23年 三井化学アグロ株式会社社内試験)



株式会社 エムシー緑化



三井化学
グループ

サンブレイク[®]液剤

- 【種類名】 ヒドロキシイソキサゾール複合肥料
 【有効成分】 ヒドロキシイソキサゾール[3-ヒドロキシ-5-メチルイソキサゾールカリウム塩]……………22.84%
 (3-ヒドロキシ-5-メチルイソキサゾールとして ……………16.5%)
 【肥料成分】 水溶性りん酸……………18.0%
 水溶性加里……………20.0%
 【性状】 黄赤色澄明水溶性液体
 【毒性】 普通物*
 【急性毒性】 ラット(♀) 経口 LD₅₀ >2000mg/kg
 ラット(♂♀) 経皮 LD₅₀ >2000mg/kg
 【魚毒性】 コイ LC₅₀(96H) >1000mg/L

*「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物、の指定を受けない物質を示す。

適用病害虫及び使用方法

作物名	適用病害名 使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ヒドロキシイソキサゾール を含む 農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	赤焼病 ピシウム病	250~ 500倍	0.5L/m ²	発病初期	4回以内	散布	6回以内
	根の生育促進			生育期 (6月~8月)	3回		

注意事項

●使用上の注意事項

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量が多すぎたり濃度が高すぎた時、場合によっては初期生育が一時制御されることがあるので、濃度や使用量を誤らないように注意してください。
- 根の生育促進に使用する場合は生育期(6月~8月)に1ヶ月間隔で3回散布してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

●人畜に有害な農薬については、その旨及び解毒方法

- 有毒ガスが発生するので、石灰硫黄合剤との混合は絶対にしないでください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

●水産動植物に有毒な農薬については、その旨

この登録に係る使用方法では該当がありません。

●引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常的使用方法ではその該当がありません。

●貯蔵上の注意事項

直射日光を避け、食品と区別し、なるべく低温な場所に密閉して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。

※本製品は芝用複合肥料入り農薬(殺菌剤)であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

※本印刷物は2012年4月1日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

販売元



株式会社 **エムシー緑化**

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7
TEL 03-6842-8590 FAX 03-6842-8593

取扱い