



農林水産省登録
第21881号


芝生用薬剤

殺菌剤

芝生用殺菌剤

トライアンプ®

水和剤



ブラウンパッチと
炭疽病、ダラースポット病の
同時防除が可能!

特長

- ① 2つの成分の相乗効果により、ベントグラスの重要病害を同時に防除することができます
- ② 浸透移行性があり、安定した高い効果を発揮します
- ③ 予防にも治療にも使用できます
- ④ 長い残効性があります



®登録商標



株式会社 二チノ一緑化



芝生用殺菌剤

トライアンフ®

水和剤

成分・性状

種類名：フルトラニル・プロピコナゾール水和剤
 有効成分：フルトラニル……………40.0%
 プロピコナゾール……………8.0%
 性状：類白色水和性粉末 45μm以下

安全性

〔毒性区分〕 普通物	急性経口毒性 (LD ₅₀)	急性経皮毒性 (LD ₅₀)
	ラット♀ >2000mg/kg	ラット♂♀ >2000mg/kg
〔魚毒性〕 A類相当	コイ	オオミジンコ
	LC ₅₀ (96hr) 11.7mg/L	EC ₅₀ (48hr) 2.3mg/L

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用時期	総使用回数*			使用方法
				本剤のみ	フルトラニル	プロピコナゾール	
芝	日本芝	625	休眠期前	4回以内	8回以内	6回以内	1㎡当り 500ml散布
	ベント グラス		葉腐病 (ブラウンパッチ)				1㎡当り 250ml~ 500ml散布
			炭疽病				
			ダラスポット病				
雪腐小粒菌核病	根雪前	1㎡当り 500ml散布					

*印は本剤およびそれぞれの有効成分を含む農業の総使用回数を示す。

効果・薬害等の注意

- 蚕に対して毒性があるので、蚕にはかからないように注意して散布して下さい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けて下さい。




葉腐病 (ブラウンパッチ) と炭疽病との併発



葉腐病 (ブラウンパッチ)




炭疽病



ダラスポット病

安全使用上の注意

- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。
- 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 使用後は洗眼してください。
- 保管: 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。



雪腐小粒菌核病



疑似葉腐病 (春はげ症)

- 使用前にラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。● 使用後の空袋は圃場などに放置せず、廃棄物処理業者に委託する等により適切に処理してください。

取扱店

株式会社 二チノ一緑化

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 岡谷ビルディング6F
 TEL (03) 3808-2281 FAX (03) 3808-2360
 大阪営業所 TEL (072) 727-8015
 ホームページアドレス <http://www.nichino-ryokka.co.jp>