

芝用茎葉処理型除草剤

フルスロット[®]

顆粒水和剤

画期的な除草剤！
ベントグリーンの
スズメノカタビラ
を防除！



メヒシバに
適用拡大



使用回数が 春夏期2回、秋冬期2回（年4回）になりました！！



株式会社 ニッソーグリーン

芝用茎葉処理型除草剤


FULL SLOT

フルスロット[®] 顆粒水和剤

包装単位：100g×10袋

■成分・性状

種類名：ベンフレート水和剤
有効成分：ベンフレート……………30.0%
構造式：



化学名：2,3-ジヒドロ-3,3-ジメチルベンゾフラン-5-イル=エタンスルホナート
性状：類白色水和性細粒

■安全性

- 人畜毒性：普通物
急性経口毒性：ラット(♀) LD₅₀>2,000mg/kg
急性経皮毒性：ラット(♂) LD₅₀>2,000mg/kg
ラット(♀) LD₅₀>2,000mg/kg
- 魚毒性：原体A類
コイLC₅₀(96hrs.) 35.00mg/l
ニジマスLC₅₀(96hrs.) 12.28mg/l
ミジンコEC₅₀(48hrs.) 35.36mg/l
- 刺激性(原液)
皮ふ刺激性(ウサギ) 刺激性なし
眼刺激性(ウサギ) 中程度の刺激性あり
- 感作性(モルモット) 皮ふ感作性なし

■適用雑草と使用方法

*印は、本剤およびその有効成分を含む農薬の、総使用回数の制限を示します。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量/m ²		総使用回数*		使用方法
			薬量(g)	希釈水量(ml)	本剤	ベンフレート	
西洋芝 (ブルーグラス)	スズメノカタビラ	春夏期 雑草発生初期～3葉期	0.2～0.3	100～200	2回	4回以内	雑草 茎葉 散布
西洋芝 (ベントグラス)	メヒシバ		0.15～0.3				
	一年生イネ科雑草	秋冬期 雑草発生初期～3葉期	0.1～0.2				

⚠ 効果・薬害等の注意

- 雑草の生育初期に有効なので時期を失ないように散布してください。
- 芝生の中や付近にある樹木類にかかるると薬害を生じるので、飛散しないように注意して散布してください。
- 散布に用いた器具類は、使用後できるだけ早く水で十分洗っておき、他の用途に使用する場合薬害の原因にならないよう注意してください。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲、誤食のないよう注意してください。
- 散布液調製時および散布の際は、保護メガネを着用して、薬剤が眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。使用後は洗眼してください。(刺激性)
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用し、散布液を浴びたり吸い込んだりしないように注意してください。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

農薬の空袋などの処理は、関係法令を遵守し、廃棄処理業者に処理を委託するなどにより適切に行ってください。

本剤の使用に当たっては
下記の点に注意してください。

- フルスロット顆粒水和剤の使用に際しては、薬害を回避するため、事前に十分な施肥管理を実施してください。
- 均一散布できる水量で散布してください。
- 春処理では0.3g/m²以下、秋処理では0.2g/m²以下で使用してください。
- 茎葉処理剤ですので、土壌処理剤エイゲンとの体系処理をおすすめします。
- 株化したスズメノカタビラが多発生している場合には、部分的に裸地状態になる場合があります。処理時期および薬量に注意してください。
- 薬剤散布後1～2週間、露がのらない状態が発生します。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

販売元  **株式会社 ニッソーグリーン**
http://www.ns-green.com/

本社 東京都台東区上野3-1-2 (秋葉原新高第一生命ビル5F)
〒110-0005 TEL.03-5816-4351

取扱店

製造元  **日本曹達株式会社**
本社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号