

チョウ目害虫から愛する芝地を守るのはこの私だ。

グリーンキーパー

司令官GK、出動命令を待っている。

チョウ目害虫 逃さない



グレモ™ SC 殺虫剤

適用芝 日本芝・西洋芝

- 特徴
- ・摂取数時間後で食害防止効果が現れ、効き目も長い
 - ・虫に直接薬剤がかからなくても処理された茎葉が摂食されれば防除できる
 - ・チョウ目害虫以外の昆虫類、ほ乳類、鳥類、魚類への安全性に優れている

種類名 メトキシフェノジド水和剤

ターゲット
スジキリヨトウ
シバツトガ



DOW

Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World

- ・摂取数時間後で食害防止効果が現れ、効き目も長い
- ・虫に直接薬剤がかからなくても処理された茎葉が摂食されれば防除できる
- ・チョウ目害虫以外の昆虫類、ほ乳類、鳥類、魚類への安全性に優れている

- 有効成分:メトキシフェノジド…20.0%
- その他の成分:水、界面活性剤等…80.0%
- 性状:淡褐色水和性粘稠懸濁液
- 有効期限:5年
- 包装:500ml×6本



本剤はチョウ目害虫の幼虫を、食毒による脱皮促進作用によって防除する昆虫成長制御剤(IGR剤)です。低濃度で、若齢～中・老齢幼虫まで優れた効果を示します。残効性及び耐雨性に優れています。臭いが少なく、チョウ目害虫以外の昆虫類、ほ乳類、鳥類、魚類への安全性に優れた薬剤です。



米国環境保護貢献賞を受賞

グレモの成分とその製剤は、米国環境保護局(EPA)から、開発から製造、野外に放出された化学物質の影響まで環境への安全性に十分配慮された製品であることが高く評価され、1995年米国環境保護貢献賞を受賞しました。


使用方法(登録内容)

作物名	適用害虫名	使用時期	使用量		本剤及びメトキシフェノジドを含む農薬の総使用回数	使用方法
			希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/㎡)		
芝	スジキリヨトウ シバツトガ	発生初期	3,000～ 4,000	0.2～0.3	6回以内	散布

上手な使い方


●昆虫の成育ステージ

卵 → 幼虫 → さなぎ → 成虫




- 発蛾最盛期～若齢幼虫の期間が防除適期です。
 - 芝刈り後に薬剤散布を行うとより効果的です。
 - 展着剤の加用をお奨めします。
 - ジアミド系等の殺虫剤との体系処理をおすすめします。
- ※本剤のコウチュウ類(コガネムシ類やシバオサゾウムシ)やカイガラムシ類に対する効果は期待できません。

●スジキリヨトウ発生消長例



●シバツトガ発生消長例



使用上・安全上の注意

- 使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
- 桑に付着する恐れのある地域では使用しないでください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さないようにしてください。空容器等は環境に影響を与えないように適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、できるだけ病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器は施設内外に放置せず、環境に影響のないように適切に処理してください。
- 防除日誌を記帳しましょう。

供給元

ダウ・ケミカル日本株式会社
 ダウ・アグロサイエンス事業部門 営業本部
 〒140-8617 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー
 URL <http://www.dowagro.com/jp/>

取扱

本資料は2013年1月現在の知見に基づき作成されています。