


# 幅広い作物に適用、 あなたの畑の 登録農薬です。



信頼と実績

# オルトラン<sup>®</sup> 水和剤

- 1 広範囲の害虫に高い効果を示します。
- 2 幅広い作物に適用があります。
- 3 有効成分は優れた浸透移行性を持ち作物全体に広がります。
- 4 長期間にわたり害虫の発生を抑えます。
- 5 オルトラン粒剤との体系防除が可能です。  
(詳しくは各薬剤の製品ラベルをご覧ください)

ヨトウムシ、アオムシ、コナガ等の食害性害虫から、アブラムシ、スリップス等の吸汁性害虫まで、広範囲の害虫に高い効果を示します。





# オルトラン水和剤 適用害虫および使用方法

農林水産省登録 第19992号

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
なす	アブラムシ類、アザミウマ類 ハスモンヨトウ、オオタバコガ	1000~2000 1000	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマナギシウツリ	1000~1500				
はくさい	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 カブラハバチ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	1000~2000 1000~1500	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
レタス	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000~1500				
非結球レタス	ヨトウムシ オオタバコガ	1000 1000	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
ブロッコリー カリフラワー	ヨトウムシ	1000				
だいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ ダイコンシンクイムシ	1500	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内 (は種前及びは種時の 処理は合計1回以内)
はつかだいこん	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 ヨトウムシ、カブラハバチ ダイコンシンクイムシ	1500~2000 1500				
非結球 あぶらな科葉菜類 (ケール、からしな、 みずな、 ルッコラを除く)	アブラムシ類	1500	収穫21日前まで	1回	散布	1回
かぶ	アオムシ、コナガ					
葉しょうが しょうが	アワノメイガ			2回以内		2回以内
こぼろ	アブラムシ類	1000	収穫45日前まで	1回		2回以内 (株元散布は1回以内、 散布は1回以内)
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ テントウムシダマシ幼虫、ヨトウムシ		収穫7日前まで	4回以内	散布	1回
ばれいしょ	アブラムシ類、ジャガイモガ アブラムシ類	1000~1500 300				
てんさい	ヨトウムシ、テンサイモグリハナバエ トビハムシ類	1000~1500 1000	収穫45日前まで	3回以内	散布	5回以内 (植付時の処理は1回以内、 植付後は4回以内)
	ヨトウムシ	16				
トマト	トビハムシ類 アブラムシ類 マメハモグリバエ	60~100 1000~2000 1000	育苗期	1回	1m <sup>2</sup> 当り2.5~3g 灌水	4回以内 (育苗期の灌水は1回以内、 散布は3回以内)
ミニトマト	アブラムシ類	1500	収穫14日前まで	1回	散布	3回以内 (定植時の処理は1回以内、 定植後は1回以内)
とうもろこし			収穫7日前まで	2回以内		2回以内
あずき	フキノメイガ、アブラムシ類、ヨトウムシ		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
やまのいも	ヤマノイモコガ、ジャガイモヒゲナガアブラムシ ハスモンヨトウ、マメシンクイガ、アブラムシ類	1000	収穫45日前まで	1回		1回
だいず	アブラムシ類	16	収穫60日前まで	3回以内	10a当り1.6g 無人ヘリコプター散布	3回以内
えだまめ	ハスモンヨトウ、アブラムシ類	1000	収穫21日前まで			
いんげんまめ	アブラムシ類		収穫14日前まで		散布	
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000~1500 300	収穫21日前まで	5回以内	散布	5回以内
		16				
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類	1000	収穫7日前まで			
ぶどう	チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ ハマキムシ類	1500~2000 1500	収穫30日前まで	2回以内		2回以内
かき	カキクダアザミウマ、チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ カキノヒメヨコバイ、フジコナカイガラムシ	1000~1500	収穫45日前まで			
かんきつ	コカクモンハマキ、シャクトリムシ類 ヤノネカイガラムシ第1世代、ツノロウムシ ルビーロウムシ、ミカンキイロアザミウマ ネギアザミウマ、コボウノミドリヒメヨコバイ	1000	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類、ケシキスイ類 コアオハナムグリ、アザミウマ類	1000~1500				
いちじく	ミカントゲコナジラミ アザミウマ類	1500~2000 2000	収穫45日前まで	1回		1回
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノコカクモンハマキ	1000~2000 1000~1500	摘採30日前まで	2回以内		2回以内
さんしょう(果実)	チャノキイロアザミウマ	1500	収穫14日前まで	1回		1回
だいおう	ヨトウムシ	1000	生育期 但し、収穫230日前まで	3回以内		3回以内
みしまさいこ			収穫30日前まで			
薬用にんじん	アブラムシ類	1500	収穫180日前まで	5回以内	散布	5回以内
ソルガム		1000	収穫30日前まで	3回以内		3回以内
たばこ	ヨトウムシ、タバコアオムシ、アブラムシ類	1500~2500	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ヤサイノウムシ ジャガイモガ若齢幼虫、ジャガイモガ中齢幼虫	1000~2000 1500~2000				
つつじ類	ツツジクビバイ					
つばき類	チャドクガ	1500				
さくら	モンクローヤチホコ アメリカシロヒトリ	1000~1500 1500~2000	発生初期	5回以内	散布	5回以内
	アザミウマ類、アブラムシ類	1000~1500				
花き類・ 観葉植物	アオムシ、ヨトウムシ類					
さく	マメハモグリバエ、オオタバコガ					
ストック	コナガ、ハイマダラノメイガ					
宿根アスター	ヨメナスジハモグリバエ					
オンシジウム	カイガラムシ類					
カーネーション	コナガ					
ひまわり	タバコガ					
斑入りアマドコロ リアトリス	ハマキムシ類	1000				5回以内
樹木類	アザミウマ類					
グラジオラス			植付時	1回	10分間球根浸漬	
芝	シバツトガ、タマナヤガ スジキリヨトウ、ケラ		発生初期	5回以内	散布	1m <sup>2</sup> 当り0.25~2g 散布
	シバオサソウムシ成虫 アカツツリガ					
もりあざみ		1500	収穫45日前まで	1回		1回
まめ科牧草	アブラムシ類	1000		3回以内	散布	3回以内

2012年12月現在の登録内容

- ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届く所には置かない。●空容器は圃場などに放置せず、適切に処理する。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望めます。

アリスタライフサイエンス株式会社  
〒104-6591 東京都中央区明石町8-1  
TEL 03-3547-4416 FAX 03-3547-4695  
http://www.agrofrontier.com