

早く効かせたい! に応える。

登録番号: 第 23330 号
荷 姿: 500ml×20 本

殺 虫 剤

サニーフィールド[®] MC

(エトフェンプロックスマイクロカプセル剤)

「サニーフィールド」は三井化学アグロ(株)の登録商標です。

- ・ 散布してから早く効く、速効性に優れた殺虫剤です。
- ・ 臭いが殆ど無く、扱いやすいマイクロカプセル化製剤です。
- ・ 樹木類にも使用できる活用幅の広い殺虫剤です。

サニーフィールド MC 効果試験

2014年 日産化学 生物科学研究所

供試虫: ハスモンヨトウ幼虫

●葉面に散布(薬剤散布後、乾いてから放虫)

サニーフィールド MC



速効的に効くため食害なし

●直接散布(放虫後薬剤散布)

サニーフィールド MC



速効的に効くため食害なし

対照剤



食害あり

対照剤



食害あり

●成分・性状

[外観] 白色水和性粘稠懸濁液体

[成分] 一般名: エトフェンプロックスマイクロカプセル剤

化学名: 2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジル=エーテル

有効成分: エトフェンプロックス 20.0%

その他の成分 水、界面活性剤等 80.0%

●作用特性など

本剤は接触毒、食毒として作用します。ノックダウン効果、残効性、忌避作用が認められています。

●芝生等の害虫防除年間管理表

| 害 虫 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| シバツトガ | | | | | | | | | | | | |
| スジキリヨトウ | | | | | | | | | | | | |
| ケ ラ | | | | | | | | | | | | |

: 発生消長

: 防除適期

● 安全性 毒性区分 普通物

| サニーフィールドMC | | |
|------------|-------------------|------------------|
| 人畜毒性 | 急性経口毒性 (LD50) | ラット > 5,000mg/kg |
| 生態毒性 | コイ (96時間LC50) | > 1,000mg/L |
| | オオミジンコ (48時間EC50) | 0.122mg/L |

● 適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 (倍) | 使用時期 | 本剤およびエトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 | 使用方法 |
|------------------|------------------|---------------|------|----------------------------|-------------------------|
| 芝 | スジキリヨトウ シバツトガ | 2000 | 発生初期 | 3回以内 | 1㎡当り 0.3L散布 |
| | ケラ | 2000 | | | 1㎡当り 1L散布 |
| 樹木類 (つつじ類を除く) | ケムシ類 | 2000~ 4000 | 発生初期 | 6回以内 | 10a当り 100~700L 散布 |
| つつじ類 | | 2000~ 4000 | | | |
| | ツツジゲンバイ | 1000 | | | |

⚠ 効果・薬害などの注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用前によく振ってから使用してください。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。
- 使用の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。使用後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。



- 蚕に対して長期間強い毒性があるので、薬液の飛散により桑の茎葉を汚染することのないように桑園のある地帯では使用しないでください。

- 散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別してください。



- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。

- ① ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散する恐れがある場合には使用しないでください。
- ② 養蜂が行われている地区や受粉等を目的としてミツバチ等を放飼している地区で使用する場合は、関係機関（都道府県の畜産部局や病害虫防除所等）への連絡を徹底し、ミツバチ等の危害防止に努めてください。



- 魚毒性：水産動植物（甲殻類、冷水魚）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用は避けてください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■ 保管上の注意

- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

[PRTR該当成分] PRTR1種 エトフェンプロックス……………20.0%

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。



株式会社 **エムシー緑化**

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7
TEL 03-6842-8590 FAX 03-6842-8593
ホームページ <http://www.mc-ryokka.com/>

取り扱い店