

芝用殺虫剤

シバマル[®]

新しいタイプの殺虫剤!
チョウ目害虫の
ローテーション散布に
おすすめします。

老齢幼虫にもよく効きます!



タマナヤガ



シバツガ



スジリトウ



住化グリーン株式会社

芝用殺虫剤

農林水産省登録 第23328号

シバマル[®]

- 成分：ピリダリル…10.0%
- 性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
- 毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
- 包装：500ml×10本

特長

1

新しいタイプの殺虫剤です。

3

優れた耐雨性と残効性があります。

2

優れた殺虫活性で、老齢幼虫に高い活性があります。

4

低濃度でも高い食害抑制効果が認められました。

■適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	ピリダリルを含む農薬の総使用回数	使用方法
芝	シバツトガ タマナヤガ スジキリヨトウ	500倍	0.2ℓ/m ²	発生初期	2回以内	2回以内	散布

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってください。
- 蚕に影響があるので、桑にかからないように注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は、手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中および散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管：密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵な所。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器等は園場などに放置せず、適切に処理してください。

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



住化グリーン株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号
TEL.(03)6837-9422 FAX.(03)6837-9423
http://www.sumika-green.jp