



シバツトガ

東 練
中 也
か
目
は

タマナヤガ

スジキリヨトウ

スピネアタック®

農水省登録第22983号



住化グリーン株式会社

芝用
殺虫剤

スピネアタック[®]

農林水産省登録 第22983号
成分：スピネトラム 25.0%
性状：類白色水和性細粒
毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している運称)
包装：100g×10本


特長

チョウ目害虫に対して強い接触毒・食毒効果を有し、速やかに摂食阻害活性を発揮します。

1

チョウ目害虫にすばやい効果

処理直後の接触毒効果




供試害虫：スジキリヨトウ
供試植物：ベントグラス
処理方法：スジキリヨトウ幼虫を所定濃度の薬液に30秒間浸漬処理し、風乾後にベントグラス実生苗に放飼。薬液に展着剤を加用。
試験規模：1区5頭～20頭
調査方法：処理または放飼1日後・3日後・6日後に、生死虫数を調べた。

2

優れた効果の持続性

処理14日後の食毒効果



供試害虫：スジキリヨトウ
供試植物：ベントグラス
処理方法：シバを所定濃度の薬液に30秒間浸漬処理し、14日後に幼虫を放飼。薬液に展着剤を加用。
試験規模：1区5頭～20頭
調査方法：処理または放飼1日後・3日後・7日後に、それぞれ生死虫数を調べた。

適用害虫および使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	スピネトラムを含む農薬の総使用回数	使用方法
芝	シバツタガ	5000	0.3ℓ/m ²	発生初期	2回以内	2回以内	散布
	タマナヤガ スジキリヨトウ	10000					

⚠️ 効果・薬害等の注意

- 散布液調製後はそのまま放置せず、速やかに使用してください。(分解)
- 使用量、使用時期、使用方法等を守ってください。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠️ 安全使用上の注意

- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。(刺激性)
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいを

して、衣服を交換してください。作業時の衣服などは他と分けて洗濯してください。

- かぶれやすい人は取り扱いに十分注意してください。
- 桑葉にかからないようにし、桑葉にかかった場合には使用後約1ヶ月間は蚕に給餌しないでください。(蚕毒)
- ミツバチに対し、以下のことに注意してください。
 - 巣箱およびその周辺にかからないようにする。
 - ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
 - 養蜂地区では周辺への飛散に注意し、危害防止に努める。

保管：密封し、食品と区別して、直射日光の当たらない涼涼・乾燥した所。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所には置かないでください。● 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

SCC GROUP
住友化学アグログループ



住化グリーン株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目5番4号
TEL.(03)3523-8282 FAX.(03)3523-8071
http://www.sumika-green.jp