

抑草剤


# チンG<sup>®</sup> 乳剤

有効成分：ニコスルフロン 4%

®は石原産業㈱の登録商標

500ml  
×6本

チガヤを  
長く、強く抑制!!



無処理区



チンG 150ml/10a

平成14年度 (公財)日植調研究所：薬剤処理日：6月5日 調査日：7月29日 (処理54日後)



石原バイオサイエンス株式会社

有効成分：ニコスルフロン・・・4%

性状：類白色粘稠懸濁液体

人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）

## 特長

### チガヤ、ススキ等の多年生イネ科の生育を長く、強く抑制

ナインG乳剤を使用することで、チガヤやススキなどの多年生イネ科雑草の伸長が抑制され、景観を維持しながら草刈および刈り草の除去等の管理場面の省力化が期待できます。また、雑草を完全に枯殺せず、のり面等の裸地化を防ぐため、土壌流亡を抑止でき、のり面が保護されます。

## 適用雑草と使用方法

※本内容は平成24年5月30日付の登録内容に基づいています。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用目的	使用時期	10アール当たり使用量		総使用回数*	使用方法
					薬量	希釈水量		
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	多年生雑草	草丈の伸長抑制による刈込軽減	雑草生育期 又は 刈込再生期 (草丈 30cm以下)	100 ～ 150ml	100ℓ	1回	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布

\*本剤およびニコスルフロンを含む農薬の総使用回数

## 上手な使い方

地域・気象条件により、雑草の発生時期や生育スピードが異なります。



- 雑草の草丈が20～30cm頃が本剤の散布適期です。雑草が大きくなりすぎると、十分な効果が期待できなくなるので、散布時期には注意してください。
- 刈込み後の散布が最も効果的です。
  - 散布液調製前には、容器をよく振って使用してください。
  - 本剤は雑草の茎葉部から吸収されますので、茎葉全体に均一にかかるように散布してください。
  - 展着剤を加用すると効果的です。
- 使用後、タンク、ホース、ブーム、ノズル内に薬液が残らないよう散布器具は十分に洗浄し、他の用途に使用する場合、薬害の原因にならないよう注意してください。

## ⚠ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 雑草生育期(草丈30cm以下)が本剤の散布適期であり、雑草が大きくなりすぎると効果が低減するので時期を失ないように散布してください。
- 広葉雑草のうちセイタカアワダチソウ、ヨメナ、ヨモギには効果が劣るので、これらの雑草が優占する場所での使用をさけてください。
- 散布薬液の飛散によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分注意して散布してください。
- 流出や土壌浸透により他の作物や有用植物の根に接触する可能性がある場所では使用しないでください。
- 公園、堤とう等で使用する場合、水源池等に本剤が飛散、流入しないよう十分注意してください。
- 散布直後の降雨は効果を低下させるので、天候を見きわめて散布してください。
- 散布器具の洗浄水および残りの薬液は河川等に流さないでください。空容器は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 原液は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。
- 散布の際は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣を着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに、衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は、他のものと分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。