

シャーク


Seed Trader
Benidai



SHARK CREEPING BENT GRASS

SHARK 歴然とした差! 各地で高評価のニューベントグラス!

4年間のNTEP継続試験で総合評価No.1を獲得



日本国内で好評の特性がNTEPでも再評価!

- ・サンド/ソイル共に優れた芝質
- ・最強の耐暑性
- ・省力管理下でも高い芝質
- ・横方向への旺盛な生育
- ・速やかなターフ形成
- ・年間を通じて高い芝密度

スズメノカタビラ
抑制効果

省力管理が可能

コストの削減

販売形態

イエロージャケットコート



非コート(生種子)



ソッド(切芝)



NEW

規格: 30cm×170cm
2枚入(約1㎡)



パッティンググリーン/フェアウェイ用クリーピングベントグラス





シャーク

NTEPの評価結果において、日本で流通しているニューベントグラスを含む全26品種中、総合評価No.1を獲得。耐暑性やローメンテナンス性、播種後の造成速度、スズメノカタビラ抑制効果など、日本で好評を得ている特性はNTEPでも確かめられました。もちろん低刈にも耐え、管理レベルをあげた場合にはその分、芝質もトーナメントレベルに仕上がります。


あらゆる場面でハイクオリティな芝質！

2008年8月公表されたNTEP4年間の評価結果より。オリジナルデータはこちらで確認できます。(http://www.ntep.org/)


■芝質の評価



■カタビラ抑制と芝生の造成速度



■芝密度の評価



造成管理

播種後の初期養生として、発芽が揃うまでの間は播種床の表面が乾かないように、天候に応じて散水を行います。刈込みの目安として草丈が30mm前後になったら、15mm程度の刈高に下げ、その後2~3日に一回刈込みを行います。その際、0.5~1.0mm程度刈高を下げていきます。また、ブラウンパッチなどの対病性は優れていますが、最低限の薬剤処理は必要です。

播種量 6~10g/m²(非コート)
10~15g/m²(イエロージャケットコート)

播種期 3~5月、9~10月

標準発芽率:80% 標準純度:98%
平均粒数:7,000粒/g(イエロージャケットコート)
13,000粒/g(非コート)

【販売店】

【輸入・販売元】

紅大貿易株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-2-12 クリハラビル
TEL:03-3256-0551(代) FAX:03-3254-7126
<http://www.benidai.co.jp/> seed@benidai.co.jp

