

■ 上手な使い方

● 「マツノマダラカミキリ」の防除

松枯れの犯人はマツノザイセンチュウです。その運び屋が「マツノマダラカミキリ」です。センチュウが侵入した松は手の施し様がありません。従って運び屋である「マツノマダラカミキリ」を早い時期に防除する事が絶対に必要です(5月上旬～下旬より1ヵ月ごとに3回)。

● 「アメリカシロヒトリ」、「アブラムシ」等の防除

アメリカシロヒトリ、アブラムシ等の庭木の害虫は、発生初期の防除が重要です。見つけたときにすぐ散布してください。

● 「カイガラムシ」の防除

5月下旬から幼虫が発生するので見つけたら15日間隔で「カイガラムシ」に対して十分量散布してください。

● 希釈表

薬剤の希釈(水10ℓに対して)			
60倍	100倍	250倍	500倍
167mℓ	100mℓ	40mℓ	20mℓ

■ 適用害虫と使用方法

散布						※本剤及びアセタミプリドを含む農薬の総使用回数	
作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法	
まつ(生立木)	マツカレハ	100~250倍	3ℓ/本(樹高10m)	幼虫発生前~幼虫発生期	5回以内 (樹幹注入は1回以内)	散布	
	マツノマダラカミキリ成虫	60~100倍		成虫発生直前から発生初期		無人ヘリコプターによる散布	
樹木類 (つじ類、とちのき、プラタナス、さんごじゆ、ひいらぎもくせい、いぬまきを除く)	ケムシ類	250倍	3~4ℓ/10a	成虫発生初期及び発生最盛期直前			
	カイガラムシ類						
つじ類	アブラムシ類	500倍	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内 (樹幹注入は1回以内)	散布	
	ツツジグンバイ チュウレンジハバチ						
あじさい	ケムシ類	250倍	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内 (樹幹注入は1回以内)	散布	
	カイガラムシ類						
とちのき	コガネムシ類	500倍	200~700ℓ/10a	発生初期	5回以内 (樹幹注入は1回以内)	散布	
	アブラムシ類						
プラタナス	ケムシ類	250倍	100~300ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	
	カイガラムシ類						
さんごじゆ	サンゴジュハムシ	500倍	100~300ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	
	アブラムシ類						
ひいらぎもくせい	ヘリグロテントウノミハムシ	500倍	100~300ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	
	アブラムシ類						
いぬまき	ケムシ類	250倍	100~300ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	
	カイガラムシ類						
ばら	キオビエダシャク	100~250倍	100~300ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	
	アブラムシ類						
ばら	チュウレンジハバチ	500倍	100~300ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	

樹幹注入

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセタミプリドを含む農薬の総使用回数
樹木類 (プラタナスを除く)	カイガラムシ類	50倍	胸高直径20cm未満は800mℓ 20~30cm未満は1000~1200mℓ 30~40cm未満は1400~1600mℓ 40~50cm未満は2200~3400mℓ 50~60cm未満は3400~5200mℓ 60cm以上は直径4cm増すごとに200mℓを順次増量する	春季~秋季	1回	樹幹注入	5回以内 (樹幹注入は1回以内)
プラタナス	プラタナスグンバイ		春季~秋季 但し収穫50日前まで				
くり	カイガラムシ類	50倍	同上	同上	同上	同上	3回以内 (樹幹注入は1回以内)

■ 安全使用上の注意 ⚠



●本剤の中毒に対しては、動物実験でL-メチオニン製剤、グリチルリチン製剤及びグルタチオン製剤の注射投与が有効であるとする報告もあります。

●蚕に対して長期間毒性があるので、桑に付着するおそれがある地域では使用しないでください。



●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。

●使用の際は農業用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをするとともに洗眼してください。

●危険物第四類第三石油類に属するので、火気には十分注意してください。

●街路・公園等で使用する場合には、使用中および使用後(少なくとも散布当日)に、小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないように、網囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

●使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関、「林業関係機関」の指導を受けてください。

保管：密栓し、火気や直射日光を避け、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に保管してください。

1ℓ入り



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

■ 販売元



株式会社 ニッソーグリーン

本社：〒110-0005 東京都台東区上野3-1-2
(秋葉原新第一生命ビル5F)
TEL: 03-5816-4351
URL: http://www.ns-green.com/



住化グリーン株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号
TEL: 03-6837-9422 FAX: 03-6837-9423
http://www.sumika-green.jp